


Resonancia magnética y biopsia de próstata: PI-RADS, vías y resultados

La resonancia magnética de próstata estima el grado de sospecha de una zona y ayuda a guiar la toma de muestras, pero solo la biopsia y la patología establecen un diagnóstico tisular. La calidad de la imagen, la vía de biopsia, el plan de muestreo y la revisión patológica deben encajar entre sí y conversarse antes del procedimiento.



Puntos clave

- Una puntuación PI-RADS estima la sospecha en la imagen; no corresponde a la escala de Gleason, el grupo de grado ni el estadio.
- Una lesión muy sospechosa puede resultar benigna, y una exploración tranquilizadora puede pasar por alto un cáncer.
- Las muestras dirigidas se toman de la lesión vista en la resonancia; las sistemáticas, de regiones que podrían albergar cáncer no visible en la resonancia.
- La biopsia puede realizarse a través del recto o de la piel perineal; la vía es una decisión de seguridad y acceso.
- El grupo de grado, la cantidad y distribución del cáncer, el PSA, la resonancia y el estadio definen en conjunto el riesgo.
- Una resonancia o biopsia negativa reduce el riesgo, pero no siempre lo elimina.

Busque atención pronto si nota

- Fiebre o escalofríos intensos después de la biopsia
- Incapacidad para orinar después de la biopsia
- Deterioro significativo después de la biopsia

Preguntas para su urólogo

- ¿Qué muestra mi resonancia magnética, cuál es su puntuación PI-RADS y qué podría pasar por alto?
- ¿Una biopsia cambiaría mi atención?
- ¿Por qué la vía de biopsia propuesta se ajusta a mi situación, y cómo se reducirá el riesgo de infección y de retención?
- ¿Tomará muestras dirigidas, sistemáticas o ambas?
- ¿Quién me explicará el informe de patología completo, y cuándo?
- Si la resonancia y la biopsia no coinciden, ¿qué parte debería revisarse?

Encuentre un urólogo cerca de usted: localurology.com · Adaptado de *A Urology Consult in a Book* (edición en español), de David Shusterman, MD, urólogo certificado. Información general, no es consejo médico. Hable con su propio médico sobre su situación.